

Ulex europaeus L.

Ajonc d'Europe

En ce promenant cette fin décembre sur le chemin d'Ossau entre Buzy et Bescat, on peut observer en fleurs l'Ajonc d'Europe dans certaines haies en limites des propriétés.



Linné l'avait identifié et décrit sous le nom de *Ulex europaeus* L. et placé dans la **classe 17 Diadelphia**

Les premières classifications l'ont placé dans la famille des **Papillonacées** appelées plus tard **Légumineuses** dans certaines Flores.

Elle porte le nom de **Fabaceae** Fabacées depuis la dernière normalisation des familles.

Trois espèces du genre *Ulex* font partie de la flore pyrénéenne :

Ulex europaeus (1)

Ulex minor (2)

Ulex gallii (3)

Ulex minor et *Ulex gallii* sont en fleurs de fin juillet à fin septembre



Ulex europaeus est naturellement présent dans les haies bocagères ; les gousses sèches chargées de graines sont emportées par les vents violents et se retrouvent arrêtées par les arbustes en limite des propriétés et les graines tombées au sol germent le plus souvent. Ces haies deviennent infranchissables pour le gros bétail.

Ulex minor et *Ulex gallii* sont plus petits et leurs épines plus souples. Souvent associés à la fougère aigle, ils recouvraient de grandes étendues de landes communales. En Ossau elles étaient divisées en parcelles et exploitées par les éleveurs pour confectionner une litière d'excellente qualité.

Aux mois de septembre et octobre, on fauchait et récoltait cette litière de Fougère aigle mélangée avec l'Ajonc nain et l'Ajonc de Legall (*pailhat de heous et touye*).

Aujourd'hui ces pratiques sont abandonnées et ces grandes étendues d'Ajoncs sont en grande partie passées au giro-broyeur et ensemencées afin de remplacer ces surfaces par du pâturage.